

Was sollte ich über Xarelto wissen?

- ◆ Xarelto verdünnt das Blut und schützt so vor der Bildung gefährlicher Blutgerinnsel.
- ◆ Xarelto muss genau nach Anleitung des Arztes eingenommen werden. Um einen optimalen Schutz vor Blutgerinnseln zu gewährleisten, **lassen Sie niemals eine Dosis aus.**
- ◆ Sie dürfen die Gabe / Einnahme von Xarelto nicht abbrechen, ohne vorher mit dem behandelnden Arzt gesprochen zu haben, da sich das Risiko für die Bildung von Blutgerinnseln erhöhen könnte.

- ◆ Informieren Sie den Arzt oder Apotheker über jedes andere Arzneimittel, welches das Kind bzw. Sie zurzeit einnehmen, kürzlich eingenommen haben oder beabsichtigen einzunehmen, vor Beginn der Einnahme von Xarelto.

- ◆ Informieren Sie den behandelnden Arzt vor jeglicher Operation oder invasivem Verfahren darüber, dass das Kind Xarelto einnimmt / Sie Xarelto einnehmen.

Wann sollte ich einen Arzt oder Apotheker um Rat fragen?

Bei der Einnahme eines Blutgerinnungshemmers wie Xarelto ist es wichtig, mit den möglichen

Nebenwirkungen vertraut zu sein. Eine Blutung ist die am häufigsten auftretende Nebenwirkung. Beginnen Sie nicht mit der Gabe / Einnahme von Xarelto, wenn Sie wissen, dass bei dem Kind / Ihnen ein Blutungsrisiko besteht. Sprechen Sie zuerst mit dem behandelnden Arzt darüber. Informieren Sie sofort einen Arzt oder Apotheker, wenn bei dem Kind / Ihnen folgende Anzeichen oder Symptome für eine Blutung bestehen:

- ◆ Schmerzen
- ◆ Schwellung oder Unwohlsein
- ◆ Kopfschmerzen, Schwindel oder Schwäche
- ◆ Ungewöhnliche blaue Flecken, Nasenbluten, Zahnfleischbluten, lang anhaltende oder sehr starke Blutungen aus Schnittwunden
- ◆ Eine Monatsblutung oder vaginale Blutung, die stärker ist als üblich

- ◆ Blut im Urin, der dadurch rötlich oder braun aussehen kann, rot oder schwarz gefärbter Stuhl
- ◆ Abhusten von Blut oder blutiges bzw. kaffeesatzartiges Erbrechen

Wie gebe ich dem Kind Xarelto / wie nehme ich Xarelto ein?

- ◆ Für einen optimalen Schutz muss Xarelto 1 mg/ml beim Füttern (Muttermilch oder Formulanahrung) oder zusammen mit einer Mahlzeit gegeben / eingenommen werden. Die Suspension kann über eine nasogastrale Sonde oder eine Magensonde verabreicht werden.

88304039 DE

Patientenausweis



Xarelto® 1 mg/ml
Granulat zur Herstellung
einer Suspension zum
Einnehmen

Informationen für Betreuungspersonen / Patienten:

- ◆ Tragen Sie diesen Ausweis ständig bei sich
- ◆ Zeigen Sie diesen Ausweis jedem Arzt oder Zahnarzt vor der Behandlung des Patienten

Schauen Sie sich das Schulungs-
video an das zeigt, wie die
Suspension zum Einnehmen
hergestellt und angewendet wird.



go.bayer.com/junior

**Der Patient, der unter einer blutgerinnungshemmenden
Behandlung mit Xarelto (Rivaroxaban) steht:**

Name: _____	Andere Medikamente / Erkrankungen: _____
Anschrift: _____	_____
_____	_____
_____	_____
Geburtsdatum: _____	Gewicht: _____

**Bitte verständigen Sie
im Notfall:**

Name des Arztes:

Telefonnummer des Arztes:

Arztstempel:

**Bitte verständigen Sie
auch:**

Name:

Telefonnummer:

Beziehung:

**Information für den Arzt
oder Apotheker:**

♦ Die INR ist zur Bestimmung der antikoagulatorischen Wirkung von Xarelto nicht aussagekräftig und sollte deshalb nicht angewendet werden.



Bayer